

Plaag/ziekte	Middel	Werkzame stof	Toel. nr.	Groep	Dosering per 100 liter	max /ha per toepassing	max aantal toepassingen per teeltcyclus of 12mnd	min interval in dagen	Opmerkingen
<b>Insecticiden en acariciden</b>									
<b>Bladluis</b>	Batavia	spirotetramat	15615 N	23	75 ml	0,9 l	6x / 12 maanden	14	Alleen in niet grondgebonden bedekte teelt.
	CLOSER	sulfoxaflor	15631 N	4c	13 ml	0,12 l	2x / 12 maanden	7	
	Gazelle	acetameprid	12809 N	4a	25 g	230 g	3x / 12 mnd	30	
	NeemAzal-T/S	azadirachtin	12455 N	26	250 ml	3,75 l	18x / 12 mnd (6 blokken)	7	max 3x / blok. Interval tussen blokken: min 1,5 maand
	Pediment rookontwik.	pirimicarb	5793 N	1a	2,5 kg	2x / 12 mnd	7	1 rookontwikelaar per 400 m <sup>2</sup> , temperatuur hoger dan 22 °C	
	Pediment	pirimicarb	15584 N	1a	50 g	0,5 kg	2x / 12 mnd	7	
	Rapтол	pyrethrinen, raapzaadolie	13230 N	3a	1 l	12 l	4x / 12 mnd	7	
	Sivanto Prime	flupyradifuron	15598 N	4d	50 ml	0,75 l	4x / 12 mnd	7	Alleen in niet grondgebonden bedekte teelt
	Sumicidin super	esfenvaleraat	10211 N	3a	50 ml	1 l	10x / 12 mnd	7	max 10 L esfenvaleraat per ha per 12 maanden
	TEPEKI	flonicamid	12757 N	29	14 g	0,14 kg	3x / 12 mnd	21	
	Decis	deltamethrin	7774 N	3a	50 ml	0,5 l	3x / 12 mnd	7	max 2,1 L deltamethrin / ha / 12 maanden
	ER II	maltodextrine	15175 N	UN	2,5 l	75 l	20x / 12 mnd	3	in onbedekte teelten max 30 l / ha per toepassing
Rapтол	pyrethrinen, raapzaadolie	13230 N	3a	2 l	12 l	4x / 12 mnd	7 / 14	wolluis: 7 dagen interval. Dop-, schild- en citruswolluis: 14 dagen interval	
<b>Mineervlieg</b>	Decis	deltamethrin	7774 N	3a	50 ml	0,5 l	3x / 12 mnd	7	max 2,1 L deltamethrin / ha / 12 maanden
	Mainspring	cytrantriliprole	15621 N	28	10 g	0,12 kg	4x / 12 mnd, 2x / teelt	7	Alleen in niet grondgebonden bedekte teelt
	Milbeknock	milbectine	12364 N	6	100 ml	1 l	9x / 12 mnd (3 blokken)	7	Max 3x per blok met interval van minimaal 28 dagen tussen de blokken
	Sumicidin super	esfenvaleraat	10211 N	3a	50 ml	1 l	10x / 12 mnd	7	ruimtebehandeling tegen vliegen: 1 l / ha. Max 10 L esfenvaleraat per ha per 12 maanden
	Vertimec Gold	abamectine	13087 N	6	50 ml	0,5 l	8x / 12 mnd	7	max 4 L abamectine / ha / 12 maanden
	Rups	<i>Bacillus thuringiensis</i> kurstaki	15885 N	11a	0,3-1 kg/ha	0,3-1 kg	36x / 12 mnd, 6x / teelt	7	max 200g / 100L water
Decis	deltamethrin	7774 N	3a	50 ml	0,5 l	3x / 12 mnd	7	max 2,1 L deltamethrin / ha / 12 maanden	
DELFIN	<i>Bacillus thuringiensis</i> kurstaki	10944 N	11a	50 g	0,75 kg	6x / 12 mnd	7		
DiPel DF	<i>Bacillus thuringiensis</i> kurstaki	14674 N	11a	100-200 g	1 kg	8x / 12 mnd	7		
Lepinox Plus	<i>Bacillus thuringiensis</i> kurstaki	14746 N	11a	0,75-1,5 kg/ha	0,75-1,5 kg	10x / 12 mnd	7	toepassen in 500 - 1500 l water per ha	
Mainspring	cytrantriliprole	15621 N	28	10 g	0,12 kg	4x / 12 mnd, 2x / teelt	7	Alleen in niet grondgebonden bedekte teelt	
NeemAzal-T/S	azadirachtin	12455 N	26	250 ml	3,75 l	18x / 12 mnd (6 blokken)	7	max 3x / blok. Interval tussen blokken: min 1,5 maand	
Oikos	azadirachtin	15729 N	26	100-120 ml	1,2 l	5x / 12 mnd	7	ook werkzaamheid getoetst op trips, mineervlieg, bladluis, wittevlieg, dwergcicaden	
Proclaim	emamectin benzoaat	13455 N	6	1,5 kg/ha	1,5 kg	3x / 12 mnd	7		
Runner	methoxyfenozide	12696 N	18	40 ml	0,8 l	2x / 12 mnd	7		
Sumicidin super	esfenvaleraat	10211 N	3a	50 ml	1 l	10x / 12 mnd	7	ruimtebehandeling tegen motten: 1 l / ha. Max 10 L esfenvaleraat per ha per 12 maanden	
Turex spuitpoeder	<i>Bacillus thuringiensis aizawai</i>	11702 N	11a	50-100 g	1 kg	6x / 12 mnd	7		
Verismo	metaflumizone	15860 N	22b	100 ml	1 l	2x / teelt	7		
XenTari	<i>Bacillus thuringiensis aizawai</i>	12437 N	11a	100 g	1,2 kg	8x / 12 mnd	5		
<b>Wittevlieg</b>	Admiral	pyriproxyfen	11828 N	7	25 ml	0,25 l	5x / 12 mnd, 1x / teelt	-	bij teelt met meerdere teeltcycli. Bij één- of meerjarige teelt max 2x per 12 maanden (7 dagen interval)
	Applaud 25 SC	buprofezin	15577 N	16	80 ml	1 l	2x / 12 mnd	22	ook werking tegen wolluis
	Botaniqard vlb	<i>Beauveria bassiana</i> stam GHA	12611 N	-	125 ml	1,5 l	25x / 12 mnd	5	alleen bedekte teelten
	Botaniqard WP	<i>Beauveria bassiana</i> stam GHA	12612 N	-	62,5 g	0,75 kg	25x / 12 mnd	5	in onbedekte teelten max 0,6 kg / ha per toepassing
	CLOSER	sulfoxaflor	15631 N	4c	13 ml	0,2 l	2x / 12 mnd	7	max 0,4 l / ha / 12 maanden
	Decis	deltamethrin	7774 N	3a	50 ml	0,5 l	3x / 12 mnd	7	max 2,1 L deltamethrin / ha / 12 maanden
	ER II	maltodextrine	15175 N	UN	2,5 l	75 l	20x / 12 mnd	3	in onbedekte teelten max 30 l / ha per toepassing
	Eradicoat Max	maltodextrine	16056 N	UN	2 l	60 l	20x / 12 mnd	3	
	Gazelle	acetameprid	12809 N	4a	25-50 g	462 g	6x / 12 mnd	7	alleen bedekte teelt
	Limocide	sinaasappelolie	16169 N	-	400 ml	4 l	6x / 12 mnd	7	
	Mycotal	<i>Lecanicillium muscari</i> stam Ve6	10980 N	-	100 g	2 kg	24x / 12 mnd	7	
	Naturalis-L	<i>Beauveria bassiana</i> ATCC74040	13857 N	-	300 ml	3 l	3x / teelt	5	toepassen in 500 - 1000 l water per ha
	NeemAzal-T/S	azadirachtin	12455 N	26	250 ml	3,75 l	18x / 12 mnd (6 blokken)	7	max 3x / blok. Interval tussen blokken: min 1,5 maand
	Oberon	spiromesifen	12588 N	23	50 ml	0,5 l	4x / 12 mnd (2 blokken)	10	Interval 10 dgn in blok en 90 dgn tussen blokken. Niet in alle potplanten! Zie etiket
	Oikos	azadirachtin	15729 N	26	100-120 ml	1,2 l	5x / 12 mnd	7	ook werkzaamheid getoetst op trips, rups, mineervlieg, bladluis, dwergcicaden
	PREFERAL	<i>Isaria fumosorosea</i> Apopka st.97	12694 N	-	100 g	3 kg	25x/12 mnd, 3x/teelt	7	
	Rapтол	pyrethrinen, raapzaadolie	13230 N	3a	1,5 l	12 l	4x / 12 mnd	7	
	Sivanto Prime	flupyradifuron	15598 N	4d	75 ml	1,125 l	4x / 12 mnd	7	alleen in niet grondgebonden bedekte teelt
	Sumicidin super	esfenvaleraat	10211 N	3a	50 ml	1 l	10x / 12 mnd	7	max 10 L esfenvaleraat per ha per 12 maanden
	Velifer	<i>Beauveria bassiana</i> PPRI 5339	16210 N	-	50 ml	1,25 l	73x / 12 mnd	5	alleen bedekte teelt
	Azatin	azadirachtin	14936 N	26	140 ml	1,4 l	20x / 12 mnd	7	5 blokken van 4 toepassingen. Interval tussen 2 blokken: 42 dagen
	Botaniqard WP	<i>Beauveria bassiana</i> stam GHA	12612 N	-	62,5 g	0,75 kg	73x / 12 mnd	5	in onbedekte teelten max 0,6 kg/ha per toepassing en max 25x / 12 maanden
	Conserve	spinosad	12363 N	5	75 ml	0,75 l	6x / 12 mnd	7	max 3x per blok. Interval 7 dagen in blok en 28 dagen tussen 2 blokken
	Decis	deltamethrin	7774 N	3a	50 ml	0,5 l	3x / 12 mnd	7	max 2,1 L deltamethrin / ha / 12 maanden
	Mainspring	cytrantriliprole	15621 N	28	10 g	0,12 kg	4x / 12 mnd, 2x / teelt	7	Alleen in niet grondgebonden bedekte teelt
	NeemAzal-T/S	azadirachtin	12455 N	26	250 ml	3,75 l	18x / 12 mnd (6 blokken)	7	max 3x / blok. Interval tussen blokken: min 1,5 maand
	Nocturn	pyridiyl	13359 N	un	150 ml	1,5 l	4x / 12 mnd (2 blokken)	7	Interval 28 dagen tussen 2 blokken. alleen bedekte teelt.
Oikos	azadirachtin	15729 N	26	100-120 ml	1,2 l	5x / 12 mnd	7	ook werkzaamheid getoetst op rups, mineervlieg, bladluis, wittevlieg, dwergcicaden	
Rapтол	pyrethrinen, raapzaadolie	13230 N	3a	1 l	12 l	4x / 12 mnd	14		
Steinernema-Systeem	<i>Steinernema feltiae</i>	-	-	-	-	-	-	voor informatie en dosering: raadpleeg uw adviseur	
Sumicidin super	esfenvaleraat	10211 N	3a	50 ml	1 l	10x / 12 mnd	7	max 10 L esfenvaleraat per ha per 12 maanden	
Velifer	<i>Beauveria bassiana</i> PPRI 5339	16210 N	-	50 ml	1,25 l	73x / 12 mnd	5	alleen bedekte teelt	
Vertimec Gold	abamectine	13087 N	6	50 ml	0,5 l	8x / 12 mnd	7	max 4 L abamectine / ha / 12 maanden	
Winner	formetanaat	14958 N	1a	30 g	0,3 kg	20x / 12 mnd, 4x / teelt	7	Alleen toepassen d.m.v. (sem)automatische toepassingsapparatuur	
Arollo	clofentezin	8794 N	10a	30 ml	0,39 l	1x per teelt	-		
Borneo	etoxazool	13227 N	10b	50 ml	0,5 l	2x of 4x / 12 mnd	7 / 7	2x =meerjarige teelt / 4x =teelt met 1 of meer cycli per jaar: 2x per cyclus. tussen blokken: 2 maand	
Carex 10 SC	pyridaol	14836 N	21	140 ml	1,9 l	1x / 12 mnd	-		
Cantack	acequincyl	12939 N	20b	100 ml	1,2 l	9x / 12 mnd (3 blokken)	7	max 3x / blok. Interval 7 dagen in blok en 28 dagen tussen 2 blokken	
ER II	maltodextrine	15175 N	UN	2,5 l	75 l	20x / 12 mnd	3	in onbedekte teelten max 30 l / ha per toepassing	
Eradicoat Max	maltodextrine	16056 N	UN	2 l	60 l	20 x / 12 mnd	3		
Floramite	bifenazaat	12421 N	20d	40 ml	0,6 l	4x / 12 mnd (2 blokken)	7	max 2x / blok. Interval 7 dgn in blok en 56 dgn tussen blokken.	
Milbeknock	milbectine	12364 N	6	50 ml	0,5 l	5x / 12 mnd	7		
Nissorun vlb	hexythiazox	10379 N	10a	20 ml	0,2 l	12x / 12 mnd (6 blokken)	7	tussen 2 blokken afwisselen min 1x met middel uit andere groep	
Oberon	spiromesifen	12588 N	23	50 ml	0,5 l	4x / 12 mnd (2 blokken)	10	max 2x / blok. Interval 10 dgn in blok en 90 dgn tussen blokken. Niet in alle potplanten! Zie etiket	
Rapтол	pyrethrinen, raapzaadolie	13230 N	3a	1 l	12 l	4x / 12 mnd	7		
Sclta	cyflumetofen	13440 N	25	100 ml	1,0 l	4x / 12 mnd (2 blokken)	7	tussen de 2 blokken afwisselen min 2x met middel uit andere groep	
Vertimec Gold	abamectine	13087 N	6	50 ml	0,5 l	8x / 12 mnd	7	max 4 L abamectine / ha / 12 maanden	

<b>Varenrouwmug</b>	<b>Gnatrol SC</b>	<i>Bacillus thuringiensis</i> subsp. israelensis	15539 N	11a	aangieten		3x / teelt	5	aangieten of druppelbehandeling: 5 - 10 ml/m <sup>2</sup>
	<b>Steinernema-System</b>	<i>Steinernema feliae</i>	-	-	aangieten				voor informatie en dosering: raadpleeg uw adviseur
<b>Aaitjes</b> (oa wortelknobbel)	<b>Vydate 10G</b>	oxamyl	12409 N	1a	potgrondbeh.	20-40 g / m <sup>3</sup>	1x per teelt	-	potgrondbehandeling direct voor oppotten; 20-40 g per m <sup>3</sup> potgrond
<b>Taxuskever</b>	<b>B-Green</b>	<i>Heterorhhabditis bacteriophora</i>	-	-	aangieten				voor informatie en dosering: raadpleeg uw adviseur
	<b>LALGUARD M52</b>	<i>Metharhizium anisoplae</i>	12589 N	-			2x / 12 mnd	7	mengen door potgrond voor planten; 0,5 kg per m <sup>3</sup> potgrond
	<b>Kraussei-System</b>	<i>Steinernema kraussei</i>	-	-					voor informatie en dosering: raadpleeg uw adviseur
<b>Slakken</b>	<b>Metarex Inov</b>	metaldehyde	14872 N	-	strooien	5 kg	3x / 12 mnd	5	
	<b>Sluuxx</b> slakkenkorrels	ijzer(III) fosfaat	13316 N	-	strooien	7 kg	4x / 12 mnd	7	7 kg per hectare ofwel 0,7 gram per m <sup>2</sup>
<b>Fungiciden</b>									
<b>Phytophthora</b>	<b>Paraat</b>	dimethomorph	11432 N	40	aangietbeh.	10,26 kg	2x / teelt	7	aangieten of via eb en vloed; 10 g / 100 L. Hiervan 150 ml per liter potgrond
	<b>Proplant</b>	propamocarb-hydrochloride	12918 N	28	aangietbehandeling		1x / 12 mnd		150 ml per 100 L water. Hiervan 100 ml per 10/11 cm pot gieten
	<b>Ranman Top</b>	cyazofamide	13467 N	21	potgrondbehandeling		1x / 12 mnd		300 ml per 10 L water per m <sup>3</sup> potgrond
	<b>Ridomil Gold</b>	metalaxyl-M	12281 N	4	12,5-18,75 ml / m <sup>3</sup>	0,5 l	6x / 12 mnd	7	Tegen tak-Phytophthora
					6,25-12,5 ml / m <sup>3</sup>		1x / 12 mnd	-	potgrondbehandeling
									max. 31,25 ml/m <sup>3</sup> potgrond / 12 mnd
<b>Botrytis</b>	<b>Amylo-X WG</b>	<i>Bacillus amyloliquefaciens</i> plantarum D	16011 N	44	2,5 kg / ha	2,5 kg	54x / 12 mnd, 6x / teelt	7	
	<b>Geoxe</b>	fludioxonil	14414 N	12	40 g	0,5 kg	2x / 12 mnd	10	
	<b>Polvversum</b>	<i>Pythium oligandrum</i> stam M1	16162 N	-	0,3 kg / ha	0,3 kg	4x / 12 mnd	6	toepassen in 500 - 1500 l water per ha
	<b>Prestop</b>	<i>Gliocladium catenulatum</i> st J1446	13413 N	-	500 g	5 kg / ha	6x / 12 mnd	21	
	<b>Prolectus</b>	fenpyrazamide	14453 N	17	1,2 kg/ha	1,2 kg	3x / teelt	7	
	<b>Sianum</b>	pyraclostrobin / boscalid	12630 N	11 / 7	1,5 kg/ha	1,5 kg	2x per teelt	12	
	<b>Switch</b>	fludioxonil / cyprodinil	12819 N	12 / 9	80 g	0,96 kg	6x / 12 mnd, 3x / teelt	7	
	<b>Teldor</b>	fenhexamide	12130 N	17	100 g	1,5 kg	3x / 12 mnd	7	
<b>Fusarium</b>	<b>Asperello T34</b>	<i>Trichoderma asperellum</i> stam T34	15212 N	NC	zie opmerking	5 kg	1x / teeltcyclus	-	mengen door teeltmedium; 10g/m <sup>3</sup> substraat
					zie opmerking		1x / teeltcyclus	-	bespuiting (zaadtrays en multipots); 10g/m <sup>3</sup> substraat of 0,5g/m <sup>2</sup> (bij 5cm diepte)
					zie opmerking		1x / teeltcyclus	-	dompelbehandeling van wortels v stekken, knollen of bollen; 0,01 g/l dompelveletoef
					zie opmerking		6x / 12mnd	60	druppelbehandeling of aangieten; 10g/m <sup>3</sup> substraat. Maximaal 19,8 kg/ha per 12 maanden
	<b>Serenade</b>	<i>Bacillus amyloliquefaciens</i> str Q51713	14536 N	44	5 l / ha	5 l	9x / 12 mnd	20	aangiet- of druppelbehandeling. Toepassen in 500-4000 l water / ha
<b>Rhizoctonia</b>	<b>Rizolex vloeibaar</b>	tolclofos-methyl	11098 N	14	250 ml / 100L / m <sup>3</sup> potgrond		1x per teelt	-	potgrondbehandeling
					100ml / 100L aangieten		1x per teelt	-	aangietbehandeling
	<b>Serenade</b>	<i>Bacillus amyloliquefaciens</i> str Q51713	14536 N	44	5 l / ha	5 l	9x / 12 mnd	20	aangiet- of druppelbehandeling. Toepassen in 500-4000 l water / ha
	<b>Sianum</b>	pyraclostrobin / boscalid	12630 N	11 / 7	1,5 kg/ha	1,5 kg	2x per teelt	12	
<b>Sclerotinia</b>	<b>Amylo-X WG</b>	<i>Bacillus amyloliquefaciens</i> plantarum D	16011 N	44	2,5 kg / ha	2,5 kg	54x / 12 mnd, 6x / teelt	7	
	<b>Sianum</b>	pyraclostrobin / boscalid	12630 N	11 / 7	1,5 kg/ha	1,5 kg	2x per teelt	12	
<b>Alternaria</b>	<b>Amylo-X WG</b>	<i>Bacillus amyloliquefaciens</i> plantarum D	16011 N	44	2,5 kg / ha	2,5 kg	54x / 12 mnd, 6x / teelt	7	
<b>Pythium</b>	<b>Prestop 4B</b>	<i>Gliocladium catenulatum</i> st J1446	13414 N	-	0,2-0,5 kg/m <sup>3</sup>	0,5 kg/m <sup>3</sup>	2x / teelt	21	Bi mengen door teeltsubstraat
	<b>Prestop 4B</b>				50-100 kg	100 kg	4x / teelt	21	Bi aangietbehandeling
	<b>Prestop 4B</b>						2x / 12 mnd	56	Druppelbehandeling of aangietbehandeling of via eb/vloedsysteem
	<b>Proplant</b>	propamocarb-hydrochloride	12918 N	28	aangietbehandeling		1x / 12 mnd		150 ml per 100 L water. Hiervan 100 ml per 10/11 cm pot gieten
					grondbehandeling		2x / 12 mnd	14	na zaaien, stekken, verspenen of oppotten; 5-10 ml in 3-6 l water per m <sup>2</sup>
	<b>Ridomil Gold</b>	metalaxyl-M	12281 N	4	potgrondbehandeling		1x / 12 mnd		300 ml per 10 L water per m <sup>3</sup> potgrond
					12,5-18,75 ml / m <sup>3</sup>		1x / 12 mnd	-	potgrondbehandeling
					6,25-12,5 ml / m <sup>3</sup>		1x / 12 mnd	-	aangieten; preventief 6,25-9,37ml/100L, curatief 9,37-12,5ml/100L
	<b>Serenade</b>	<i>Bacillus amyloliquefaciens</i> str Q51713	14536 N	44	5 l / ha	5 l	9x / 12 mnd	20	aangiet- of druppelbehandeling. Toepassen in 500-4000 l water / ha
<b>Valse Meeldauw</b>	<b>Inssimo</b>	acibenzolar-S-methyl	14882 N	P1	5 g	50 g	15x / 12 mnd, 3x / teelt	7	alleen in impatiens. Toepassen in 500 - 1000 l water / ha
	<b>Prestop 4B</b>	propamocarb, fosetyl	13221 N	28 / P07	150 ml	1,5 l	2x / 12 mnd	7	
	<b>Ranman Top</b>	cyazofamide	13467 N	21	0,5 l / ha	0,5 l	6x / 12 mnd	7	
<b>Echte Meeldauw</b>	<b>Ranman Top</b>	zwavel	16161 N	M2		0,128 kg		0,5	1 zwavelverdampfer per 250-1000 m <sup>2</sup>
	<b>Afencas G Sulnhur Tablets</b>	azoxystrobin, difenoconazole	15909 N	11 / 3	100 ml	1,2 l	15x / 12 mnd, 3x / teelt	7	In grondgebonden teelt max 2x / 12 maanden en max 0,9 l / ha / toepassing
	<b>Alibi Flora</b>	<i>Bacillus amyloliquefaciens</i> plantarum D	16011 N	44	2,5 kg / ha	2,5 kg	54x / 12 mnd, 6x / teelt	7	
	<b>Amylo-X WG</b>								
	<b>Collis</b>	kresoxim-methyl, boscalid	12504 N	11 / 7	100 ml	1,5 l	6x / 12 mnd	7	Ook tegen roest (150 ml / 100l)
	<b>Fado</b>	COS-OGA	14921 N	-	3 - 4 l		12x / 12 mnd, 5x / teelt	7	m.u.v. Eénjarige perkplanten, bolbloemen, knolbloemen, cactussen, succulenten
	<b>Flint</b>	trifloxystrobin	12289 N	11	12,5 g	0,125 kg	3x / 12 mnd	7	
	<b>Frupica SC</b>	mepanipyrim	12229 N	9	90 ml	0,9 l	2x per teelt	7	Neveneffect op botrytis
	<b>Fungaflash</b>	imazalil	7119 N	3	50 ml	0,6 l	12x / teelt	7	bedekte teelt. Max 7,2 l / ha / 12 maanden
					200 ml	2,4 l	3x / teelt	7	
	<b>Inssimo</b>	acibenzolar-S-methyl	14882 N	P1	5 g	50 g	15x / 12 mnd, 3x / teelt	7	alleen in potgerbera, potkalanchoë en potroos. Toepassen in 500 - 1000 l water / ha
	<b>Kumulus S</b>	zwavel	6147 N	M2	400 g	4,0 kg	6x / 12 mnd	10	
	<b>Luna Privilege</b>	fluopyram	13832 N	7	50 ml	0,75 l	2x / 12 mnd	7	Nevenwerking op Botrytis en Sclerotinia. Op substraat: max 6x per 12 maanden
	<b>Ortiva</b>	azoxystrobin	12169 N	11	80 ml	0,96 l	3x / jaar	7	niet toepassen in winterperiode
	<b>Serenade</b>	<i>Bacillus amyloliquefaciens</i> str Q51713	14536 N	44	5 l / ha	5 l	6x / 12 mnd	5	Toepassen in 500 - 2000 l water / ha
	<b>Sonata</b>	<i>Bacillus pumilus</i> QST 2808	15871 N	44	10 l / ha	10 l	7x / 12 mnd	5	Toepassen in 200 - 1500 l water / ha
	<b>Takumi</b>	cyflufenamid	15541 N	U6	0,15 l / ha	0,15 l	2x / 12 mnd	7	alleen in begonia, kalanchoë, poinsettia, saintpaulia, anthurium, chrysant en gerbera
<b>Roest (Puccinia spp.)</b>	<b>Collis</b>	kresoxim-methyl, boscalid	12504 N	11 / 7	100 ml	1,5 l	6x / 12 mnd	7	
	<b>Inssimo</b>	acibenzolar-S-methyl	14882 N	P1	5 g	50 g	15x / 12 mnd, 3x / teelt	7	alleen in potchrysant en -kalanchoë. Onbedekte potchrysant max 3x/12 mnd. Toepassen in 500-1000 l water/ha
	<b>Topaz 100 EC</b>	penconazole	9364 N	3	50 ml	0,5 l	12x / 12 mnd, 3x / teelt	7	
<b>wortel- en stengelbasisrot (Cylindrocadium spp.)</b>	<b>Sporgon</b>	prochloraz	8555 N	3	100 g aangieten		6x / 12 mnd, 3x / teelt	14	bedekte teelt. Pleksgewijs aangieten. Dosering afhankelijk van potmaat; zie etiket!
<b>Wortelziekten (Pythium, Phytophthora spp. Rhizoctonia, Fusarium spp.)</b>	<b>Prestop</b>	<i>Gliocladium catenulatum</i> st J1446	13413 N	-	zie opmerking	250g/1000pl.	6x / 12 mnd	28	druppelen; 200-250 g / 1000 planten
					zie opmerking	500g/1000pl.	2x / 12 mnd	28	mengen door substraat; 200-500 g / 1000 planten
					5-10 g/m <sup>2</sup>	10 g/m <sup>2</sup>	6x / 12 mnd	28	aangieten

Om resistentie te voorkomen moeten de middelen uit de verschillende groepen met elkaar worden afgewisseld

Indeling insecticiden (IRAC)	Indeling fungiciden (FRAC)
1a) carbamaten	1) MBC - fungiciden
1b) org. tostorverbindingen	2) DM1 - fungiciden
3) pyrethroiden	4) PA - fungiciden
4) neonicotinen	7) SDH
5) spinosyns	9) AP - fungiciden
6) avermectinen	11) Ool - fungiciden
7) pyriproxyfen	12) PP - fungiciden
9) pymetrozine	14) aromatic hydrocarbons & heteroaromatics
10) thiazolidines	17) hydroxyaniliden
11) Bacillus thuringiensis	28) carbamates
12) org. tinverbindingen	P07) phosphonates
	40) CAA - fungiciden
	M2) inorganic
	M3) dithiocarbates and relatives
	M4) phthalimides
	M5) chloronitrils
	NC) diverse

#### Neveneffect op natuurlijke bestrijders

inzetbaar in geïntegreerde teelt  
Gedeeltelijk te combineren met natuurlijke bestrijders  
Niet te combineren met natuurlijke bestrijders

voor de beste combinatie van chemische met biologische bestrijding kunt u contact opnemen met uw specialist gewasbescherming

**Biobest Nederland B.V.**

Leehove 31, 2678 MA De Lier

Tel. +31 174 752250

Algemeen en orders: [csnl@biobestgroup.com](mailto:csnl@biobestgroup.com)

\* Lees voor het gebruik altijd het etiket op de verpakking.

\* Alle informatie op deze lijst is bedoeld als advies.

\* Omdat de toepassing buiten onze controle gebeurt, zijn wij niet aansprakelijk voor eventuele schadelijke gevolgen.

\* Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schadelijke gevolgen, die kunnen ontstaan bij of als gevolg van het gebruik.

\* Het is niet toegestaan zonder toestemming van Biobest Nederland BV deze lijst te verspreiden of te kopiëren.