

Plaag/ziekte	Middel	Werkzame stof	Toel.nr.	Groep	Toepassings gebied	Dosering per 100 liter	max/ ha per toepassing	max toepassing 12 maanden - teelt	min interval in dagen	Opmerkingen	Hommelst	Nawerking Hommelst	Wachtijd in dagen
Insecticiden en acariciden													
Bladluisk													
Batavia	spirotramat		15615	N 23	onbedekt	0,75 l / ha	0,75 l	2x / 12 maand	14	gewasbehandeling: 14 dagen voor bloei, danwel na-oogst	B	24 h	14
Gazelle	acetamiprid		12809	N 4a	bedekt	75 ml	0,9 l	-	-	gewasbehandeling: toepassen tot 14 dagen voor bloei	B	24 h	-
Movento	spirotramat		13404	N 23	vermeerdering	250 g / ha	250 g	1x / 12 maand	14	-	B	24 h	-
Oikos	azadirachtin		15729	N 26	onbedekt, niet-grondgeb.	100-150 ml	0,5 l	2x / 12 maand	7	-	A	-	7
Primor	pirimicarb		5794	N 1a	bedekt	50 g	0,6 kg	2x / 12 maand	7	werkt niet tegen alle soorten luizen	B	24 h	3
Sivanto Prime	flupyradifuron		15598	N 4d	onbedekt, niet-grondgeb. bedekt, grondgebonden	50 ml	0,5 l	2x / 12 maand 1x / 12 maand	10	-	A	-	3
Rups													
CoStar WG	<i>Bacillus thuringiensis</i> kurstaki		15885	N 11a	bedekt	0,3-1 kg/ha	1 kg	6x / teeltcyclus	7	max 100g/100L. Toepassen in 1000 L water / ha	A	-	-
Decis	deltamethrin		7774	N 3	onbedekt	20 ml	0,12 l	2x / teeltcyclus	14	max 1,5 L deltamethrin / ha / 12 maanden	B	72 h	3
DiPel DF	<i>Bacillus thuringiensis</i> kurstaki		14674	N 11a	bedekt	100 g	1 kg	8x / 12 maand	7	ook onbedekt; 0,5 - 1 kg / ha	A	-	-
EXALT	spinetoram		16028	N 5	bedekt, grondgebonden	2 l / ha	2 l	3x / 12 maand	14	-	B	24 h	3
Lepinox Plus	<i>Bacillus thuringiensis</i> kurstaki		14746	N 11a	bedekt	1,0 kg / ha	1 kg	3x / teeltcyclus	7	-	A	-	-
Oikos	azadirachtin		15729	N 26	bedekt, niet-grondgeb.	100-150 ml	1,5 l	4x / 12 maand	7	-	A	-	7
Steward opz	indoxacarb		15867	N 22a	bedekt	125 g / ha	125 g	2x / 12 maand	7	-	B	72 h	3
Tracer	spinosad		12567	N 5	bedekt	0,15 l / ha	0,15 l	3x / 12 maand	7	-	B	24 h	1
Turex 50 WP	<i>Bacillus thuringiensis</i> aizawai		11702	N 11a	onbedekt	50-100 g	1 kg	3x / 12 maand	7	-	A	-	-
XenTari	<i>Bacillus thuringiensis</i> aizawai		12437	N 11a	onbedekt	1 kg / ha	1 kg	8x / 12 maand	6	-	A	-	-
Witte vlieg													
Botanigard WP	<i>Beauveria bassiana</i>		12612	N -	bedekt	62,5 g	0,75 kg	12x / teeltcyclus	5	-	B	16 h	-
ER II	maltodextrine		15175	N UN	bedekt	2,5 l	30 l	20x / 12 maand	3	-	A	-	1
Eradicoat Max	maltodextrine		16056	N UN	bedekt	2 l	24 l	20x/teelt;40x/12mnd	3	-	A	-	1
Mycotal	<i>Lecanicium masicarum</i> stam Ve6		10980	N -	bedekt	100 g	1 kg	12x / teeltcyclus	7	-	A	-	1
Naturalis-L	<i>Beauveria bassiana</i> ATCC74040		13857	N -	onbedekt	0,75-1 l / ha	1 l	15x / 12 mnd	5	Toepassen in 600-1000 l water / ha	A	-	-
Oberon	spirosefen		12588	N 23	bedekt, niet-grondgeb.	50 ml	0,5 l	4x/12 mnd (2 blok)	10 (tussen blok 90)	laatste toep. 2 weken voor verschijnen 1e bloemknoppen (BBCH55)	A	-	*
Oikos	azadirachtin		15729	N 26	bedekt, niet-grondgeb.	100-150 ml	1,5 l	4x / 12 maand	7	-	A	-	7
PREFERAL	<i>Isaria fumosorosea</i> Apopka st.97		12694	N -	bedekt	100 g	1,5 kg	12x / teeltcyclus	7	-	A	-	-
Protac SF	silicone polymeren		-	-	-	75 ml	-	-	-	toepassen onder goed drogende omstandigheden	A	-	-
Sivanto Prime	flupyradifuron		15598	N 4d	bedekt, niet-grondgeb. bedekt, grondgebonden	62,5 ml	0,625 l	2x / 12 maand 1x / 12 maand	10	-	A	-	3
Trips													
Decis	deltamethrin		7774	N 3	onbedekt	20 ml	0,12 l	2x / teeltcyclus	14	max 1,5 L deltamethrin / ha / 12 maanden	B	72 h	3
EXALT	spinetoram		16028	N 5	bedekt, grondgebonden	2 l / ha	2 l	3x / 12 maand	14	max 2,1 L deltamethrin / ha / 12 maanden	B	24 h	3
Naturalis-L	<i>Beauveria bassiana</i> ATCC74040		13857	N -	onbedekt	1-1,5 l / ha	1,5 l	15x / 12 mnd	5	Toepassen in 600-1000 l water / ha	A	-	-
Oikos	azadirachtin		15729	N 26	bedekt, niet-grondgeb.	100-150 ml	1,5 l	4x / 12 maand	7	-	A	-	7
Tracer	spinosad		12567	N 5	bedekt	0,15 l / ha	0,15 l	3x / 12 maand	7	-	B	24 h	1
Velfier	<i>Beauveria bassiana</i> PPRI 5339		16210	N -	bedekt	50 ml	1,25 l	73x / 12 mnd	5	-	A	-	-
Vertimec Gold	abamectine		13087	N 6	onbedekt	0,5 l / ha	0,5 l	1x / 12 maand	-	onbedekt: max 1 L abamectine / ha / 12 maanden	B	72 h	3
Winner	formetanaat		14958	N 1a	bedekt	30 g	0,3 kg	4x / 12 maand	7	bedekt: max 4 L abamectine / ha / 12 maanden	-	-	x
Spint													
Apollo	chlofentezin		8794	N 10a	bedekt, niet-grondgeb.	30 ml	0,3 l	1x / teeltcyclus	-	tot opgegaan eerste bloem of na laatste pluk	B	36 h	3
Borneo	etoxazool		13227	N 10b	bedekt	50 ml	0,5 l	1x / 12 maand	-	-	A	-	3
Cantack	acequinocyl		12939	N 20b	bedekte vermeerderingsteelt	100 ml	1,2 l	3x / 12 maand	7	-	A	-	n.v.t.
Envidor	spirochlofen		12477	N 23	bedekt	40 ml	0,4 l	2x / 12 maand	7	In productieteelt alleen tot bloei toegestaan	C	-	n.v.t.
ER II	maltodextrine		15175	N UN	bedekt	2,5 l	30 l	20x / 12 maand	3	-	A	-	1
Eradicoat Max	maltodextrine		16056	N UN	bedekt	2 l	24 l	20x/teelt;40x/12mnd	3	-	A	-	1
Flipper Plus	vetzuren, kaliumzouten		15184	N -	bedekt	2 l	16 l	5x / teeltcyclus	7	-	A	-	1
Floramate	bifenazaat		12421	N 20d	bedekt	40 ml	0,4 l	4x/12 mnd (2 blok)	7	max 2x per blok. Interval tussen 2 blokken: 56 dagen	B	48 h	1
Milbeknock	milbectine		12364	N 6	onbedekt	50 ml	0,5 l	2x / 12 maand	7	alleen tot bloei en na pluk en in vermeerdering van planten	B	72 h	n.v.t.
Naturalis-L	<i>Beauveria bassiana</i> ATCC74040		13857	N -	onbedekt	0,75-1 l / ha	1 l	15x / 12 mnd	5	Toepassen in 600-1000 l water / ha	A	-	-
Nissorun vloeibaar	hexythiazol		10379	N 10	bedekt	20 ml	0,24 l	1x / teeltcyclus	-	trage aanvagswerk. werkt tegen ei- en nimfenstadia	B	12 h	3
Oberon	spirosefen		12588	N 23	bedekt, niet-grondgeb.	50 ml	0,5 l	4x/12 mnd (2 blok)	10 (tussen blok 90)	laatste toep. 2 weken voor verschijnen 1e bloemknoppen (BBCH55)	A	-	*
Scelta	cyflumetofen		13440	N 25	bedekt, niet-grondgeb. onbedekte vermeerderingsteelt	100 ml	1,0 l	4x / 12 maand 1 l / ha 1,0 l	10 7	max 1 blok van 2x per teelt. Dan min 2x afwisselen tussen blokken	A	-	1
Vertimec Gold	abamectine		13087	N 6	onbedekt	0,5 l / ha	0,5 l	1x / 12 maand	-	onbedekt: max 1 L abamectine / ha / 12 maanden	B	72 h	3
Aardbeibloesemkever													
Benevia	cytraniliprole		15569	N 28	onbedekt	0,75 l / ha	0,75 l	2x / teeltcyclus	7	Toepassen in 300-1000 l water / ha	A	-	1
Decis	deltamethrin		7774	N 3	bedekt	20 ml	0,12 l	2x / 12 maand	14	max 1,5 L deltamethrin / ha / 12 maanden	B	72 h	3
Taxuskever													
Bio 1020	<i>Metarhizium anisopliae</i> stam F52		12589	N -	bedekt	0,5 kg/m3	0,5 kg/m3	2x / 12 maand	7	temp. moet tussen 15 en 30°C voor goede werking	A	-	n.v.t.
B-Green	<i>Heterorhabdittis bacteriaphora</i>		-	-	-	-	-	-	-	Nematoden voor aangietbehandeling	A	-	-
Kraussei-System	<i>Steinernema kraussei</i>		-	-	-	-	-	-	-	Nematoden voor aangietbehandeling	A	-	-
Suzuki fruitvlieg													
Benevia	cytraniliprole		15569	N 28	onbedekt	0,75 l / ha	0,75 l	2x / teeltcyclus	7	Toepassen in 300-1000 l water / ha	A	-	1
EXALT	spinetoram		16028	N 5	bedekt, grondgebonden	2 l / ha	2 l	3x / 12 maand	14	-	B	24 h	3
Aaltjes													
Cedroz	thymol, geraniol		16012	N	bedekt, grondgebonden	45 - 90 ml	9 l	6x / 12 maand	5	Tegen wortelknobbeaaltjes. Druppelbehandeling; 10.000-20.000 l / ha	A	-	-
NEMguard DE	knoffoextract		15262	N UN	onbedekt	400 g	20-60 kg	1x / teeltcyclus 2x / teeltcyclus	14	Volveldsbehandeling kort voor planten of tijdens planten	A	-	7
Vydate 10G	oxamyl		12409	N 1a	vermeerderingsvelden	40 kg / ha	40 kg	1x / 12 maand	-	Volveldsbehandeling na opkomst	-	-	-
Fungiciden													
Meeldauw													
Afepasa Greenhouse Sulphur Tablets	zwavel		16161	N M2	bedekt		0,032 kg		0,5	1 zwavelverdamper per 1000 m2	A	-	-
Amilo-X WG	<i>Bacillus amyloliquefaciens</i> plantarum D747		16011	N 44	onbedekt	2,5 kg / ha	2,5 kg	6x / 12 maand	7	-	A	-	1
Abir	bupirimaat		14748	N 8	bedekt, niet-grondgeb.	1,0 l / ha	1,0 l	4x / teeltcyclus	10	max 12x / 12 maanden	A	-	3
Armistar	azoxystrobin		11767	N 11	bedekt	1,0 l / ha	1,0 l	3x / 12 maand	7	-	A	-	3
AQ 10	<i>Ampelomyces quisqualis</i> st. AQ10		14294	N -	bedekt	35-70 g / ha	35 - 70 g	12x / 12 mnd	7	Toepassen in 500-1000 liter water / ha	A	-	-
Bifasto	difenoconazole / flupyroxad		15902	N 3 / 7	bedekt	0,6 l / ha	0,6 l	3x / 12 maand	7	Toepassen vanaf begin bloei (BBCH 60)	A	-	1
Fado	COS-OGA		14921	N NC	bedekt	3 - 4 l	3 - 4 l	5x / teeltcyclus	7	max 10x / 12 maanden	A	-	-
Flint	trifloxystrobin		12289	N 11	onbedekt	125 g / ha	0,125 kg	3x / 12 maand	7	-	A	-	3
Frupica SC	mepaniprim		12229	N 9	onbedekt	0,9 l / ha	0,9 l	2x / teeltcyclus	7	-	A	-	1
Karma	kaliumwaterstofcarbonaat		13854	N NC	onbedekt	3 kg / ha	3 kg	8x / 12 maand	7	-	A	-	1
Kumulus-S	zwavel 80%		6147	N M2	bedekt	400 g	3 kg	8x / teeltcyclus	7	-	A	-	-
Luna Privilege	flupyrim		13832	N 7	bedekt	50 ml	0,5 l	6x / 12 maand	10	voor en na de oogst toepassen in 300-2000 l water / ha	A	-	-
Luna Sensation	trifloxystrobin / flupyrim		14437	N 11 / 7	onbedekt		0,8 l	2x / 12 maand	7	-	A	-	1

(vervolg) Meeldauw	Product	Actieve stof	Registratienummer	Classificatie	Beleggen	Doel	Concentratie	Behandeling	Frequentie	Toelating	Opmerkingen	Beleggen	Doel	Concentratie	Behandeling	Frequentie	Toelating	Opmerkingen
Nimrod 250 EC	buperimaat		14747	N	8	onbedekt	1,0 l / ha	1,0 l	4x / 12 maand	10			A	-	-	3		
Ortiva	azoxystrobin		12169	N	11	onbedekt	1,0 l / ha	1,0 l	3x / jaar	7			A	-	-	3		
Serenade	Bacillus amyloliquefaciens	str.QST 713	14536	NC	44	bedekt en onbedekt	5 - 8 l / ha	8 l	6x / 12 maand	5	toepassen in 400-1000 l water / ha		A	-	-	-		
Sonata	Bacillus pumilus	QST 2808	15871	NC	44	bedekt	5 - 10 l / ha	10 l	6x / 12 maand	5			A	-	-	1		
Stroby WG	kresoxim-methyl		11818	N	11	bedekt	30 g	0,3 kg	2x / 12 maand	7			A	-	-	7		
Thiovit Jet	zwavel 80%		5395	N	M2	bedekt	400 g	4,8 kg	4x / 12 maand	5	niet tijdens oogst toepassen		A	-	-	-		
						onbedekt	400 g	4,8 kg	3x / 12 maand	5	toepassen tot en met juli, niet tijdens oogst		A	-	-	-		
Takumi	cyflufenamid		15541	U	6	bedekt en onbedekt	0,15 l / ha	0,15 l	2x / teeltcyclus	7			A	-	-	3		
Topaz 100 EC	penconazool		9364	N	3	onbedekt	0,5 l / ha	0,5 l	2x / 12 maand	10			A	-	-	3		
						bedekt, niet-grondgeb.	0,5 l / ha	0,5 l	4x / 12 maand	10			A	-	-	3		
Vacciplant	laminarin		13383	NC		onbedekt	0,75 l / ha	0,75 l	7x / teeltcyclus	10	toepassen in max 500 l water per ha		A	-	-	-		
Vivando	metrafenon		14231	NC	50	bedekt, grondgebonden	0,3 l / ha	0,3 l	2x / 12 maand	7			A	-	-	3		
						bedekt, niet-grondgeb.	0,3 l / ha	0,3 l	2x / teeltcyclus	7			A	-	-	3		
Botrytis																		
Amylo-X WG	Bacillus amyloliquefaciens	plantarum D747	16011	NC	44	onbedekt	2,5 kg / ha	2,5 kg	6x / 12 maand	7			A	-	-	1		
						bedekt	2,5 kg / ha	2,5 kg	6x / teeltcyclus	7	max 12x / 12 maanden		A	-	-	1		
Botector	Aureobasidium nullulans	DSM14940/14941	16066	-	-	bedekt en onbedekt		1 kg	6x / 12 maand	0	Rijenbehandeling		A	-	-	1		
						onbedekt	250 ml	1,5 l	2x / 12 maand	10			A	-	-	14		
Captosan 500 SC	captan		10104	N	M4	bedekt	250 ml	3,0 l	2x / 12 maand	10			A	-	-	14		
						bedekt en onbedekt	0,7-0,9 l/ha	0,9 l	2x / teeltcyclus	7			A	-	-	1		
Frupica SC	metanpyrim		12229	N	9	bedekt en onbedekt	0,7-0,9 l/ha	0,9 l	2x / teeltcyclus	10			A	-	-	1		
Geoxe	fludioxonil		14414	N	12	onbedekt	0,5 kg	0,5 kg	2x / 12 maand	10			A	-	-	3		
Luna Privilege	fluopyram		13832	N	7	bedekt	50 ml	0,5 l	2x / 12 maand	7			A	-	-	1		
Luna Sensation	trifloxystrobin / fluopyram		14437	N	11 / 7	onbedekt	0,8 l / ha	0,8 l	2x / 12 maand	7			A	-	-	1		
Malvin WG	captan 80%		6782	N	M4	onbedekt	150 g	0,9 kg	2x / 12 maand	10			A	-	-	14		
						bedekt	150 g	1,8 kg	2x / 12 maand	10			A	-	-	14		
Merpan Sprockelkorrel	captan 80%		11462	N	M4	onbedekt	150 g	1,8 kg	2x / 12 maand	10			A	-	-	14		
						bedekt	150 g	1,8 kg	2x / 12 maand	10			A	-	-	14		
Polyversum	Pythium oligandrum	stam M1	16162	NC		onbedekt	0,1 kg / ha	0,1 kg	8x / 12 maand	5	toepassen in 300-1000 l water / ha		A	-	-	-		
						bedekt	0,3 kg / ha	0,3 kg	4x / 12 maand	5	toepassen in 500-1200 l water / ha		A	-	-	-		
Prestop 4B	Glodiadium catenulatum	st. J1446	13414	N		bedekt		25x / teeltcyclus	1	5-10 g / hommelkast. 1 - 2 hommelkasten / 1000 m²		A	-	-	n.v.t.			
Prolectus	fenpyrazamine		14453	N	17	bedekt en onbedekt	1,2 l / ha	1,2 kg	3x / teeltcyclus	7	toepassen in 500-1500 liter water / ha		A	-	-	1		
Pyrus 400 SC	pyrimethanil		14810	N	9	bedekt	2 l	2 l	2x / 12 maand	21	bedekt: toepassen in 200 l/ha. Onbedekt in 400-1000 l/ha		A	-	-	3		
Serenade	Bacillus amyloliquefaciens	str.QST 713	14536	NC	44	bedekt en onbedekt	5 - 8 l / ha	8 l	6x / 12 maand	5	toepassen in 400-1000 l water / ha		A	-	-	-		
						bedekt	0,5 kg / ha	0,5 kg	2x / 12 maand	10			A	-	-	3		
Safir	fludioxonil		14434	N	12	onbedekt	2 l / ha	2 l	2x / 12 maand	7			A	-	-	3		
Scala	pyrimethanil		11555	N	9	onbedekt, grondgebonden	0,5 kg / ha	0,5 kg	6x/teelt, 12x/12mnd	5			A	-	-	1		
Serifel	Bacillus amyloliquefaciens	str. MBI 600	15888	NC	44	bedekt	1,8 kg / ha	1,8 kg	2x / 12 maand	7			A	-	-	1		
Signum	pyraclostrobin / boscalid		12630	N	11 / 7	onbedekt	1,8 kg / ha	1,8 kg	2x / 12 maand	7			A	-	-	1		
Switch	fludioxonil / cyprodinil		12819	N	12 / 9	onbedekt	1 kg / ha	1 kg	3x / 12 maand	10			B	12 uur	-	3		
Taegro	Bacillus amyloliquefaciens	st. FzB 24	15794	NC	44	bedekt	185-370g /ha	0,37 kg	12x / teeltcyclus	3	toepassen in 200-1000 l water / ha		A	-	-	4 uur	3	
Teldor	fenhexamide		12130	N	17	onbedekt	1,5 kg / ha	1,5 kg	3x / 12 maand	7			A	-	-	1		
						bedekt	100 g	1,2 kg	3x / 12 maand	7			A	-	-	1		
wortelrot (<i>Pythium</i> spp. + <i>Phytophthora</i> spp.)																		
	Proplant	propamocarb hydrochloride	12918	N	28	bedekte opk.v. + vermeerdering	300 ml		1x / 12 maand	-	dompelbehandeling		-	-	-	-		
						bedekte opk.v. + vermeerdering	150 ml		1x / 12 maand	-	aangietbehandeling. Max 4,425 l / ha		-	-	-	-		
						onbedekte opk.v. + vermeerd.	1,5 l / ha	1,5 l	1x / teeltcyclus	-	druppelbehandeling of aangietbehandeling		-	-	-	-		
						bedekte opk.v. + vermeerdering	2 l / ha	2 l	4x / 12 maand	7	druppelbehandeling		-	-	-	-		
						opkweek + vermeerderingssteel	1,5 l / ha	1,5 l	10x / 12 maand	10	gewasbehandeling. In onbedekte teelt max 6x / 12 maanden		-	-	-	-		
Pythium + Fusarium																		
	Asperello T34	Trichoderma asperellum st. T34	15212	NC		bedekt	zie opmerking	5 kg/ha	1x / teeltcyclus	-	mengen door teeltmedium; 10g / m3 substraat. Max 5 kg/ha/teeltcyclus		A	-	-	-		
						bedekt	zie opmerking		1 - 2x / teeltcyclus	-	bespuiting (trays,multipots); 10g/m3 substr. of 0,5g/m2 (5cm diepte)							
						bedekt, substraat	zie opmerking	5kg/ha/teelt	1 - 2x / teeltcyclus	7	druppelbeh. of aangieten; 10g/m3, eventueel in 2 x 5g/m3							
						bedekt, volgrond	zie opmerking	5kg/ha/teelt	1 - 2x / teeltcyclus	7	druppelbeh. of aangieten; 2x 2,5 kg/ha.							
Rhizoctonia (<i>Rhizoctonia fragariae</i>)																		
Serenade	Bacillus amyloliquefaciens	str.QST 713	14536	NC	44	bedekt en onbedekt	5 l / ha	5 l	6x / 12 maand	20	Aangietbehandeling. Toepassen in 500-4000 l water / ha		A	-	-	-		
						bedekt	10 l / ha	10 l	1x/teelt, 2x/12 mnd	-	Grondbehandeling. Toepassen in 200-500 l water / ha							
						onbedekt	10 l / ha	10 l	1x / 12 maand	-	Grondbehandeling. Toepassen in 200-500 l water / ha							
						onbedekt	1 l / 100 l	7,15 l	1x / teeltcyclus	-	Dompelbehandeling							
Roodwortelrot (<i>Phytophthora Fragariae</i>)																		
Allette	fosethyl-aluminium		11561	NC	33	onbed. productieteelt	7,5 kg / ha	7,5 kg	3x / 12 maand	28	Rijenbehandeling		B	48 uur	-	14		
						onbed. opk.v. + vermeerdering	7,5 kg / ha	7,5 kg	1x / 12 maand	-	Gewasbehandeling							
Polyversum	Pythium oligandrum	stam M1	16162	NC		onbedekt	50 ml	0,2 kg	1x / 12 maand	-	Aangieten of rijenbehandeling in 400 l water per ha		A	-	-	-		
						bedekte opk.v. + vermeerdering	300 ml		1x / 12 maand	-	dompelbehandeling							
						bedekte opk.v. + vermeerdering	150 ml		1x / 12 maand	-	aangietbehandeling. Max 4,425 l / ha							
Proplant	propamocarb hydrochloride		12918	N	28	onbedekte opk.v. + vermeerd.	1,5 l / ha	1,5 l	1x / teeltcyclus	-	druppelbehandeling of aangietbehandeling							
						bedekte opk.v. + vermeerdering	2 l / ha	2 l	4x / 12 maand	7	druppelbehandeling							
						opkweek + vermeerderingssteel	1,5 l / ha	1,5 l	10x / 12 maand	10	gewasbehandeling. In onbedekte teelt max 6x / 12 maanden							
Previcur Energy	propamocarb, fosetyl		13221	N	28 / 33	onbed. opk.v. + vermeerdering	300ml/100L	300ml/100L	1x / teeltcyclus	-	Dompelbehandeling		A	-	-	-		
						onbed. opk.v. + vermeerdering	80 ml/100L	2,36 l	1x / teeltcyclus	-	Druppel- of aangietbehandeling							
Stengelbasisrot (<i>Phytophthora cactorum</i>)																		
Allette	fosethyl-aluminium		11561	NC	33	onbedekt	250 g	10 kg	1x / 12 maand	-	Dompelbehandeling voor het planten							
						onbed. productieteelt	7,5 kg / ha	7,5 kg	1x / 12 maand	-	Rijenbehandeling		B	48 uur	-	14		
						onbed. opk.v. + vermeerdering	7,5 kg / ha	7,5 kg	1x / 12 maand	-	Gewasbehandeling							
Paraat	dimethomorph		11432	N	40	onbedekt	3 kg / ha	3 kg	1x / 12 maand	-	onder glas 0,1 g/plant in 100 ml water druppelen		B	24 uur	-	35		
						bedekt	zie opmerking	11 kg	1x / teeltcyclus	-	druppelbehandeling direct na uitplanten; 0,1 g per 100 ml per plant							
Polyversum	Pythium oligandrum	stam M1	16162	NC		onbedekt	0,1 kg / ha	0,1 kg	8x / 12 maand	5	toepassen in 300-1000 l water / ha		A	-	-	-		
Polyversum	Pythium oligandrum	stam M1	16162	NC		onbedekt	50 ml	0,2 kg	1x / 12 maand	-	Aangieten of rijenbehandeling in 400 l water per ha		A	-	-	-		
Previcur Energy	propamocarb, fosetyl		13221	N	28 / 33	onbed. opk.v. + vermeerdering	300ml/100L	300ml/100L	1x / teeltcyclus	-	Dompelbehandeling		A	-	-	-		
						onbed. opk.v. + vermeerdering	8											