

| Plaag/ziekte | Middel | Werkzame stof | Toel. nr. | Groep | Dosering per 100 liter | max /ha per toepassing | max toepassing per 12 mnd | min interval in dagen | Opmerkingen |
|----------------------------------|--|--|--|--------------|------------------------|---------------------------|---------------------------|--|---|
| Insecticiden + acariciden | | | | | | | | | |
| Bladluis | Batavia | spirotetraat | 15615 N | 23 | 75 ml | 0,9 l | 6x / 12 mnd | 7 | In grondgebonden teelt max 2x / 12 maanden |
| | CL OSEK | sulfoxaflor | 15631 N | 4c | 13 ml | 0,7 l | 3x / 12 mnd | 7 | |
| | Gazelle | acetamiprid | 12809 N | 4a | 29 g | 2,30 g | 3x / 12 mnd | 7 | |
| | NeemAzal-T/S | azadirachtin | 12455 N | 26 | | 3,75 l | 18x/12mnd, 3x/blok | 7 | Interval 1,5 maand tussen 2 blokken |
| | Neudosan | vetzuren, kaliumzouten | 16452 N | UN | 2 l | 36 l | 5x / teelt | 5 | |
| | Oikos | azadirachtin | 15729 N | 26 | 100 ml | 0,9 l | 5x / 12 mnd | 7 | bedekte niet-grondgebonden teelt |
| | Pediment rookontwikkelaar | pirimicarb | 5793 N | 1a | 100 ml | 0,8 l | 35x/12mnd, 5x/teeltcyclus | 7 | bedekte grondgebonden teelt |
| | Pediment | pirimicarb | 15584 N | 1a | 50 g | 2,5 kg | 2x / 12 mnd | 7 | 1 rookontwikkelaar per 400m2 |
| | Protac SF | siliconen polymeren | - | - | - | - | - | - | toepassen onder goed drogende omstandigheden. Mogelijke gewasreactie |
| | Sivanto Prime | flupradifuron | 15598 N | 4d | 50 ml | 0,75 l | 4x / 12 mnd | 7 | In grondgeb. teelt 0,5 l/ha (max 2x/12 mnd) of 0,75 l/ha (1x/12 mnd) |
| | SPYRO | pyrethrinen | 15842 N | 3a | 0,65 l/ha | 0,65 l | 9x/12 mnd, 3x/teeltcyclus | 7 | toepassen in 275-600 l water per ha. Kan met ruimtebehandeling worden toegepast |
| | Sumicidin super | esfenvaleraat | 10211 N | 3a | 50 ml | 1 l | 10x / 12 mnd | 7 | max 10 l esfenvaleraat per ha per 12 maanden |
| | TEPPEKI | flonicamid | 12757 N | 29 | | 0,14 kg | 3x / 12 mnd | 21 | |
| | ER II | maltodextrine | 15175 N | UN | 2,5 l | 75 l | 20x / 12 mnd | 3 | |
| | Rups | CoStar WG | <i>Bacillus thuringiensis</i> kurstaki | 15885 N | 11a | 0,3-1 kg/ha | 0,3-1 kg | 36x/12mnd, 6x/teeltcyclus | 7 |
| Decis | | deltamethrin | 7774 N | 3a | 50 ml | 0,5 l | 3x / 12 mnd | 7 | max 2,1 L deltamethrin / ha / 12 maanden |
| DELFIN | | <i>Bacillus thuringiensis</i> kurstaki | 10944 N | 11a | 50 g | 0,75 kg | 6x / 12 mnd | 7 | |
| DiPel DF | | <i>Bacillus thuringiensis</i> kurstaki | 14674 N | 11a | 100-200 g | 1 kg | 8x / 12 mnd | 7 | |
| EXALT | | spinetoram | 16028 N | 5 | 2 l / ha | 2 l | 3x / 12 mnd | 14 | alleen bedekte, grondgebonden teelt. Toepassen in 300-1000 l water / ha |
| Lepinox Plus | | <i>Bacillus thuringiensis</i> kurstaki | 14746 N | 11a | 0,75-1,5 kg/ha | 0,75-1,5 kg | 10x / 12 mnd | 7 | |
| Mainspring | | cyantraniliprole | 15621 N | 28 | 10 g | 0,25 kg | 4x/12 mnd, 2x/blok | 7 | bedekte niet-grondgeb. teelt. Interval 60 dagen tussen blokken |
| NeemAzal-T/S | | azadirachtin | 12455 N | 26 | | 3,75 l | 18x/12mnd, 3x/blok | 7 | Interval 1,5 maand tussen 2 blokken |
| Oikos | | azadirachtin | 15729 N | 26 | 100 ml | 0,9 l | 35x/12mnd, 5x/teeltcyclus | 10 | bedekte niet-grondgebonden teelt |
| Proclaim | | emecten benzoaat | 13455 N | 6 | 1,5 kg/ha | 1,5 kg | 3x / 12 mnd | 7 | |
| Runner | | methoxyfenozide | 12696 N | 18 | 40 ml | 0,8 l | 2x / 12 mnd | 7 | |
| Sumicidin super | | esfenvaleraat | 10211 N | 3a | 50 ml | 1 l | 10x / 12 mnd | 7 | max 10 l esfenvaleraat per ha per 12 maanden |
| Verisimo | | <i>Bacillus thuringiensis</i> aizawai | 11702 N | 11a | 50-100 g | 1 kg | 6x / 12 mnd | 7 | |
| XenTari | | <i>Bacillus thuringiensis</i> aizawai | 12437 N | 11 | 100 g | 1,2 kg | 8x / 12 mnd | 5 | In grondgebonden teelt max 2x / 12 maanden |
| Wittevlieg | | Admiral | pyriproxyfen | 11828 N | 7 | 25 ml | 0,3 l | 2x / 12 mnd | 7 |
| | Applaud 25 SC | buprofezin | 15577 N | 16 | 80 ml | 1 l | 2x / 12 mnd | 22 | |
| | Botanigard WP | <i>Beauveria bassiana</i> stam GHA | 12612 N | - | 62,5 g | 0,9 kg | 25x / 12 mnd | 5 | bedekte teelt |
| | CLOSER | sulfoxaflor | 15631 N | 4c | 26 ml | 0,4 l | 2x / 12 mnd | 7 | max 0,4 l / ha / 12 maanden |
| | Decis | deltamethrin | 7774 N | 3a | 50 ml | 0,5 l | 3x / 12 mnd | 7 | max 2,1 L deltamethrin / ha / 12 maanden |
| | ER II | maltodextrine | 15175 N | UN | 2,5 l | 75 l | 20x / 12 mnd | 3 | |
| | Eradicoat Max | maltodextrine | 16056 N | UN | 2 l | 60 l | 20x / 12 mnd | 3 | |
| | Gazelle | acetamiprid | 12809 N | 4a | 25-50 g | 462 g | 6x / 12 mnd | 7 | |
| | Limocide | sinaasappelleolie | 16169 N | - | 400 ml | 4 l | 6x / 12 mnd | 7 | toepassen in 300-1000 l water/ha |
| | Mycotal | <i>Leucantrium muscardi</i> stam V66 | 10980 N | - | 100 ml | 3 kg | 2x / 12 mnd | 7 | alleen tegen larve. 250 ml Addit toevoegen voor betere werking |
| | Naturalis-L | <i>Beauveria bassiana</i> ATCC74040 | 13857 N | - | 300 ml | 3 l | 3x / teeltcyclus | 5 | Toepassen in 500-1000 liter water / ha |
| | NeemAzal-T/S | azadirachtin | 12455 N | 26 | | 3,75 l | 18x/12mnd, 3x/blok | 7 | Interval 1,5 maand tussen 2 blokken |
| | Neudosan | vetzuren, kaliumzouten | 16452 N | UN | 2 l | 36 l | 5x / teelt | 5 | |
| | Oberon | spiromesifen | 12588 N | 23 | 50 ml | 0,5 l | 4x/12 mnd, 2x/blok | 10 | Interval 90 dgn tussen de blokken. In grondgeb. teelt max 2x/12 mnd |
| | Oikos | azadirachtin | 15729 N | 26 | 100 ml | 0,9 l | 35x/12mnd, 5x/teeltcyclus | 10 | bedekte niet-grondgebonden teelt |
| Oroqanic | sinaasappelleolie | 15958 N | - | 400-800 ml | 2 l | 5x/teelt, 35x/12mnd | 7 | toepassen in 100-300 l water/ha. Ook spint, trips, wip-, dop- en bladluis | |
| PREFERAL | <i>Isaria fumosorosea</i> Apopka st.97 | 12694 N | - | 100 g | 3 kg | 25x / 12 mnd | 7 | | |
| Protac SF | siliconen polymeren | - | - | 75 ml | 0,75 ml | - | - | toepassen onder goed drogende omstandigheden. Mogelijke gewasreactie | |
| Sivanto Prime | flupradifuron | 15598 N | 4d | 75 ml | 1,125 l | 4x / 12 mnd | 7 | alleen niet-grondgebonden teelt | |
| Sumicidin super | esfenvaleraat | 10211 N | 3a | 50 ml | 1 l | 10x / 12 mnd | 7 | max 10 l esfenvaleraat per ha per 12 maanden | |
| Welder | <i>Beauveria bassiana</i> PPRI 5339 | 16210 N | 3a | 50 ml | 1,25 l | 73x / 12 mnd | 5 | alleen bedekte teelt | |
| Trips | Azatin | azadirachtin | 14936 N | 26 | 140 ml | 1,68 l | 20x / 12 mnd | 7 | 5 blokken van 4 toepassingen. Interval tussen 2 blokken: 42 dagen |
| | Botanigard WP | <i>Beauveria bassiana</i> stam GHA | 12612 N | - | 62,5 g | 0,9 kg | 73x / 12 mnd | 5 | bedekte teelt |
| | Conserve | spinetoram | 12363 N | 5 | 75 ml | 0,75 l | 6x/12 mnd, 3x/blok | 7 | Interval 28 dagen tussen 2 blokken |
| | Decis | deltamethrin | 7774 N | 3a | 50 ml | 0,5 l | 3x / 12 mnd | 7 | max 2,1 L deltamethrin / ha / 12 maanden |
| | EXALT | spinetoram | 16028 N | 5 | 2 l / ha | 2 l | 3x / 12 mnd | 14 | alleen bedekte, grondgebonden teelt. Toepassen in 300-1000 l water / ha |
| | Limocide | sinaasappelleolie | 16169 N | - | 800 ml | 8 l | 6x / 12 mnd | 7 | toepassen in 500-1000 l water/ha |
| | Mainspring | cyantraniliprole | 15621 N | 28 | 10 g | 0,25 kg | 4x/12 mnd, 2x/blok | 7 | bedekte, niet-grondgeb. teelt. Interval 60 dagen tussen blokken |
| | NeemAzal-T/S | azadirachtin | 12455 N | 26 | | 3,75 l | 18x/12mnd, 3x/blok | 7 | Interval 1,5 maand tussen 2 blokken |
| | Nocturn | pyridalif | 13359 N | UN | 150 ml | 1,5 l | 4x/12 mnd, 2x/blok | 7 | Interval 28 dagen tussen 2 blokken |
| | Oikos | azadirachtin | 15729 N | 26 | 100 ml | 0,9 l | 35x/12mnd, 5x/teeltcyclus | 10 | bedekte niet-grondgebonden teelt |
| | Requiem Prime | terpenoid blend QRD 460 | 15599 N | - | 650 ml | 10 l | 12x / 12 mnd | 7 | max 10 l esfenvaleraat per ha per 12 maanden |
| | Sumicidin super | esfenvaleraat | 10211 N | 3a | 50 ml | 1 l | 10x / 12 mnd | 7 | |
| | Velifer | <i>Beauveria bassiana</i> PPRI 5339 | 16210 N | 3a | 50 ml | 1,25 l | 73x / 12 mnd | 5 | alleen bedekte teelt |
| | Vertimec Gold | abamectine | 13087 N | 6 | 50 ml | 0,6 l | 5x / 12 mnd | 7 | max 4 l abamectine / ha / 12 maanden |
| | Winner | formetanaat | 14958 N | 1a | 30 g | 0,3 kg | 4x / teeltcyclus | 7 | |
| Spint | Apollo | clofentazin | 8794 N | 10a | 30 ml | 0,39 l | 1x / teeltcyclus | - | bedekte niet-grondgebonden teelt |
| | Borneo | etoxazool | 13227 N | 10b | 50 ml | 0,75 l | 2x / 12 mnd | 7 | bedekte teelt |
| | Cartack | acequinozol | 12959 N | 20b | 100 ml | 1,2 l | 9x/12mnd, 3x/blok | 7 | Interval 28 dagen tussen 2 blokken |
| | Chorax 10SC | pyridaben | 14638 N | 21 | 140 ml | 1,9 l | 1x / 12 mnd | - | niet-grondgebonden bedekte teelt |
| | ER II | maltodextrine | 15175 N | UN | 2,5 l | 75 l | 20x / 12 mnd | 3 | |
| | Eradicoat Max | maltodextrine | 16056 N | UN | 2 l | 60 l | 20x / 12 mnd | 3 | |
| | Fioramite | bifenazaat | 12421 N | 20d | 40 ml | 0,6 l | 4x/12 mnd, 2x/blok | 7 | Interval 56 dagen tussen 2 blokken |
| | Milbeknock | milbectine | 12364 N | 6 | 50 ml | 0,5 l | 5x / 12 mnd | 7 | |
| | NeemAzal-T/S | azadirachtin | 12455 N | 26 | | 3,75 l | 18x/12mnd, 3x/blok | 7 | Interval 1,5 maand tussen 2 blokken |
| | Neudosan | vetzuren, kaliumzouten | 16452 N | UN | 2 l | 36 l | 5x / teelt | 5 | |
| | Neoson vib | hexazinon | 14538 N | 10a | 20 ml | 0,3 l | 3x / 12 mnd | 7 | |
| | Oberon | spiromesifen | 12588 N | 23 | 50 ml | 0,5 l | 4x/12 mnd, 2x/blok | 10 | Interval 90 dgn tussen de blokken. In grondgeb. teelt max 2x/12 mnd |
| | Requiem Prime | terpenoid blend QRD 460 | 15599 N | - | 650 ml | 10 l | 12x / 12 mnd | 7 | |
| | Scelta | cyflumetofen | 13440 N | 25 | 100 ml | 1,5 l | 4x/12 mnd, 2x/blok | 7 | Tussen blokken min 2 toepass. met middelen uit andere chem. groep |
| | Vertimec Gold | abamectine | 13087 N | 6 | 50 ml | 0,75 l | 3x / 12 mnd | 7 | max 4 l abamectine / ha / 12 maanden |
| Fungiciden | | | | | | | | | |
| Echte Meeldauw | | | | | | | | | |
| Afépsa G Sulphur Tablets | zwavel | | 16161 N | M2 | | 0,128 kg | | 0,5 | 1 zwavelverdamper per 250-1000 m2 |
| Amylo-X WG | <i>Bacillus amyloliquifaciens</i> plantarum D747 | 16011 N | 44 | 2,5 kg / ha | 2,5 kg | | 15x / 12 mnd | 7 | |
| Albi | bupirifosfen | 14746 N | 8 | 200 ml | 3 l | 4x / teeltcyclus | 7 | bedekte, niet-grondgebonden teelt | |
| Alibi Flora | axoxystrobin, difenoconazol | 15909 N | 11 / 3 | 100 ml | 3 l | 4x/12 mnd, 2x/blok | 7 | bedekte substraatteelt. Interval 120 dagen tussen 2 blokken | |
| Bifasto | difenoconazol, flupyroxad | 15902 N | 3 / 7 | | 1,5 l | 10x / 12 mnd | 7 | bedekte niet-grondgeb. teelt. Toepassen in 500-1500 l / water / ha | |
| Collis | kresoxim-methyl, boscalid | 12504 N | 11 / 7 | 100 ml | 1,5 l | 6x / 12 mnd | 7 | | |
| Fado | COS-OGA | 14921 N | - | | 2 - 4 l | 15x / 12 mnd | 7 | | |
| Flint | trifloxystrobin | 12289 N | 11 | 12,5 g | 0,125 kg | 3x / 12 mnd | 7 | | |
| Frupica SC | mepanipiril | 12229 N | 9 | 90 ml | 0,9 l | 2x / teeltcyclus | 7 | Neveneffect op botrytis | |
| Fungiflash | imazalium | 7119 N | 3 | 200 ml | 3 l | 3x / teeltcyclus | 7 | niet-grondgebonden bedekte teelt | |
| Geoxe | kaliumwaterstofcarbonaat | 13854 N | NC | 5 kg / ha | 5 kg | 20x / 12 mnd | 7 | | |
| Limocide | sinaasappelleolie | 16169 N | - | 600 ml | 6 l | 6x / 12 mnd | 7 | toepassen in 300-1000 l water/ha | |
| Luna Privilege | fluopyram | 13832 N | 7 | 50 ml | 0,75 l | 6x / 12 mnd | 7 | Alleen bedekte teelt. Op substraat max 6x, in grond max 2x/12 mnd | |
| Meltax | doxomorf | 5076 N | 5 | 250 ml | 3,75 l | 52x / 12 mnd | 7 | niet vernevelen, niet mengen met andere middelen | |
| Ortiva | azoxystrobin | 12169 N | 11 | 80 ml | 0,96 l | 3x / jaar | 7 | niet in lichtarme periode toepassen | |
| Romeo | ceresivane | 15726 N | UN | 0,75 kg / ha | 0,75 kg | 8x / 12 mnd | 7 | toepassen in 100 - 1000 l water per ha | |
| Serenade | <i>Bacillus amyloliquifaciens</i> str. QST 713 | 14538 N | 44 | 0,5 kg / ha | 0,5 kg | 15x / 12 mnd | 5 | | |
| Serifee | <i>Bacillus amyloliquifaciens</i> str. MBI 600 | 15888 N | 44 | 0,5 kg / ha | 0,5 kg | 70x / 12 mnd, 10x / teelt | 5 | Toepassen in 150 - 400 l water / ha | |
| Sonata | <i>Bacillus pumilus</i> QST 2808 | 15871 N | 44 | 10 l / ha | 10 l | 7x / 12 mnd | 5 | Opgebruik tot 28-02-2025 | |
| Takumi | cyflumetofen | 15541 N | 25 | 100 ml | 1,5 l | 2x / 12 mnd | 7 | | |
| Topaz 100 EC | penconazol | 9364 N | 3 | 25-50 ml | 0,75 l | 4x / 12 mnd | 7 | bedekte grondgeb. teelt. (in onbedekte teelt; 0,5 l/ha en max 2x per 12 maanden) | |
| Collis | kresoxim-methyl, boscalid | 12504 N | 11 / 7 | 150 ml | 1,5 l | 6x / 12 mnd | 7 | | |
| Sclerotinia | Bifasto | difenoconazol, flupyroxad | 15902 N | 3 / 7 | | 2 l | 10x / 12 mnd | 7 | bedekte niet-grondgeb. teelt. Toepassen in 500-1500 l / water / ha |
| | Siqum | pyraclostrobin, boscalid | 12630 N | 11 / 7 | 1,5 kg / ha | 1,5 kg | 2x / teeltcyclus | 12 | bedekte grondgeb. teelt. Toepassen in 300-1500 l water / ha |
| Botrytis | Amylo-X WG | <i>Bacillus amyloliquifaciens</i> plantarum D747 | 16011 N | 44 | 2,5 kg / ha | 2,5 kg | 15x / 12 mnd | 7 | |
| | Botector | <i>Aurobasidium nullulans</i> DSM 14941, 14940 | 16066 N | 1 | 1 kg / ha | 1 kg | 6x / 12 mnd | 0 | |
| | Geoxe | fluidioxonil | 14414 N | 12 | 40 g | 0,5 kg | 2x / 12 mnd | 10 | |
| | Polyversum | <i>Pythium oligactum</i> stam MI | 16162 N | - | 0,3 kg / ha | 0,3 kg | 4x / 12 mnd | 6 | toepassen in 500 - 1500 l water per ha |
| | Prolectus | fenpropimorf | 14453 N | 17 | 50 g | 1,2 kg | 3x / teeltcyclus | 7 | |
| | Romeo | ceresivane | 15726 N | UN | 0,75 kg / ha | 0,75 kg | 8x / 12 mnd | 7 | toepassen in 100 - 1000 l water per ha |
| | Siqum | pyraclostrobin, boscalid | 12630 N | 11 / 7 | 1,5 kg / ha | 1,5 kg | 2x / teeltcyclus | 12 | |
| | Switch | fludioxonil, cyprodinil | 12819 N | 12 / 9 | 80 g | 0,96 kg | 6x/12mnd, 3x/teelt | 7 | in grondgebonden teelt max 3x / 12 maanden |
| | Teldor | fenhexamid | 12130 N | 17 | 100 g | 1,5 | | | |